



# GENEL BİLGİ HIPOSPADİYAS

## ÇOCUK CERRAHİSİ BÖLÜMÜ

(Baş: Univ.-Prof. Ernst Horcher)

TIP Üniversitesi Viyana

Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien

Währinger Gürtel 18-20

1090 Wien

Sevgili Veliler,

Oğlunuzda tıpta 'Hipospadyas' dedigimiz, yani bazı erkek çocukların pipisinde görülen anormali (yarım sünnet) bulunmaktadır. Çocuk doktorunuz belki ameliyat gerekli olduğunu söylemiştir. AKH'daki çocuk cerrahları olarak Hipospsadyası nasıl tedavi ettiğimize dair sizi bu konuda bilgilendirmek istiyoruz. Yaklaşık olarak 1 hafta boyunca hastanemizde oğlunuz misamirimiz olacaktır. Velilerden birisi oğlunuzla birlikte refakatçi olarak hastanede kalabilir. Hastanede kalacağınız süreyi, ameliyatı ve tüm organizasyonları çocuklara en uygun bir şekilde düzenliyoruz. Şayet bir sorunuz olursa lütfen bu numarayı arayın:

Tel: 01/ 40 400 6830 veya [andrea.mold@meduniwien.ac.at](mailto:andrea.mold@meduniwien.ac.at)

Hipospadyas ameliyatı çocuğun 6'ncı ayından itibaren yapılır.

Hormonel ön tedavi istisnayı durumlarda gerekebilir.

Tercih edilen yöntemler: Mathieu veya Snodgrass dir. Biz Hipospadyayı tek bir ameliyat ile düzeltmeyi hedefliyoruz. Penisde bir şekil değişikliği var ise burada aynı zamanda düzeltiyoruz.

Ameliyattan bir gün önce 17E nolu çocuk cerrahisi bölümümüze gelmeniz gerekiyor. Bütün muayeneler, ameliyat ve narkoz hakkında detaylı açıklamalar verilecektir.

Sorunsuz Hipospadyalarda ayrıca bir ek muayene gerekmiyor. Daha sorunlu Hipospadyalarda çocuk doktoru ile birlikte başka muayenelerden geçmeniz gerekiyor (ultrason, hormonlar, v.s.)

Çocuk narkoz ekibi tarafından çocuklara özel narkoz kullanılacaktır.

Mikroskopik cerrahi malzemeleri ve büyüteç gözlük kullanılacaktır.

Mathieu tekniği ile ameliyat edilen uç Hipospadyalarda idrar sondasına, göbek sondasına ve sargıya gerek yoktur.

Şayet gerekirse göbek sondası takılacaktır, ameliyata göre 5 ile 7 gün arası veya yara iyileşene kadar bir idrar stenti kullanılacaktır.

Bölümümüzde günde 2 defa kontrol (visite) yapılır.

Oğlunuz sorunsuz idrar yapabildiği andan itibaren hastanemizden ayrılabilir.

4 ile 10 gün arası hastanede kalmanız gerekli.

1. ve 6. hafta sonrası ve ayrıca 6 ay sonrası bölümümüzde kontrole gelmeniz gerekli.